


DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LA CONJUNTIVITIS NEONATAL

PROCEDIMENT DIAGNÒSTIC

El diagnòstic és clínic. Es basa en la presència d'hiperèmia conjuntival i secreció. S'ha de realitzar una exploració ocular externa i tinció amb fluoresceïna de la còrnia. És recomanable considerar la valoració pel part del Servei d'Oftalmologia Pediàtrica, es pot preguntar per si és possible fins les 14 hores en dies laborals; fora d'aquest horari s'avisarà a l'oftalmòleg de guàrdia de l'Hospital General. De tota manera, els pediatres d'urgències, amb la supervisió inicial del Servei d'Oftalmologia Pediàtrica, poden ser capaços de diagnosticar de forma fiable una conjuntivitis neonatal.

RECOLLIDA DE MOSTRES



IMPRIMIR LA SOL·LICITUD DE LES MOSTRES A TRAVÉS DEL PRECONFIGURAT A SAP: PRECONFIGURATS---UNITAT TRACTAMENT URG PED. Hi ha 2 peticions, una urgent i una altra programada, assignar la data del mateix dia a la petició programada per poder imprimir-la.

SEGUIMENT I CONTROLS DELS PACIENTS AMB CONJUNTIVITIS NEONATAL

Tot nadó amb conjuntivitis neonatal s'ha de citar a primera visita a CEX d'Oftalmologia Pediàtrica (realitzar la petició pel SAP i afegir en motiu de consulta "conjuntivitis neonatal" sense marcar el dia exacte) per tal de realitzar un seguiment evolutiu i obtenció dels resultats de cultius i tècniques de biologia mol·lecular. En casos de sospita de conjuntivitis per *N. gonorrhoeae*, i en cas que no quedi el pacient ingressat, es citarà el pacient a Urgències Pediàtriques per control clínic a les 24 hores.