









Precaucions d'aïllament

per a pacients pediàtrics amb infecció per virus respiratoris

Pacient Immunocompetent

Virus respiratori	Tipus d'aïllament	Equip de protecció individual				Habitació compartida	Durada de l'aïllament**
							
Virus respiratori sincicial (VRS)	Contacte i gotes	✓	✓	✓	✓	Només amb pacients amb la mateixa infecció	7 dies si milloria de la clínica***
Grip	Gotes			✓	✓	Només amb pacients amb la mateixa infecció	5 dies si milloria de la clínica
SARS-CoV-2 (COVID-19)	Contacte i gotes	✓	✓	✓	✓	Només amb pacients amb la mateixa infecció	5 dies si milloria clínica i TAR negatiu o 7 dies sense cap prova
Adenovirus	Contacte i gotes	✓	✓	✓	✓	Només amb pacients amb la mateixa infecció	Durada de la clínica
Resta de virus respiratoris • Bocavirus • Coronavirus • Enterovirus • <i>Metapneumovirus</i> • Parainfluenza	Gotes			✓	✓	Amb qualsevol pacient (immunocompetent i sense patologies de risc per a infeccions respiratòries greus) amb sospita o confirmació d'infecció per aquests virus respiratoris	Durada de la clínica
Sospita d'infecció per virus respiratoris	Gotes			✓	✓	Amb qualsevol pacient (immunocompetent i sense patologies de risc per a infeccions respiratòries greus) amb sospita o confirmació d'infecció per virus respiratoris que no siguin l'adenovirus, el virus de la grip, el SARS-CoV-2 o el VRS	Segons el diagnòstic de la infecció

Pacient Immunodeprimit

Virus respiratori	Tipus d'aïllament	Equip de protecció individual				Habitació compartida	Durada de l'aïllament**
							
Virus respiratori sincicial (VRS)	Contacte i gotes	✓	✓	✓	✓	Només amb pacients amb la mateixa infecció	7 dies després de la desaparició de la clínica
Grip	Gotes			✓	✓	Només amb pacients amb la mateixa infecció	7 dies després de la desaparició de la clínica
SARS-CoV-2 (COVID-19)	Contacte i gotes	✓	✓	✓	✓	Només amb pacients amb la mateixa infecció	21 dies si milloria clínica i TAR negatiu
Adenovirus	Contacte i gotes	✓	✓	✓	✓	Només amb pacients amb la mateixa infecció	7 dies després de la desaparició de la clínica
Resta de virus respiratoris • Bocavirus • Coronavirus • Enterovirus • <i>Metapneumovirus</i> • Parainfluenza	Gotes			✓	✓	Només amb pacients amb la mateixa infecció	7 dies després de la desaparició de la clínica
Sospita d'infecció per virus respiratoris	Gotes			✓	✓	No, fins tenir el diagnòstic	Segons el diagnòstic de la infecció

* Es recomana l'ús de protecció ocular si es preveuen esquitxades de secrecions respiratòries (pe, tos, esternuts).
** En cas de dubte, consulteu l'equip de control de la infecció: 29750 (cerca-persones) o extensions 4219 i 4214.
*** Milloria de la clínica: 24 hores sense febre (si en presentava) i millora dels símptomes respiratoris.